

Протокол проведения процедуры ботулинотерапии препаратом Диспорт.

Показания:

- мимические морщины лица у взрослых;
- гипергидроз

Противопоказания к применению:

- гиперчувствительность к любому из компонентов препарата (доказанная аллергия на белки);
- синдромы патологической мышечной утомляемости (миастения, местнические и миастеноподобные синдромы);
- нарушение свертываемости крови;
- беременность, кормление грудью;
- острое заболевание и стадия обострения хронических заболеваний;
- локальный воспалительный процесс в месте инъекции;
- возраст старше 65 лет;
- выраженный гравитационный птоз тканей лица;
- выраженные «грыжи» в области верхних и нижних век;
- период менее 3 месяцев после операции на лице.

Продолжительность процедуры: до 30 мин.

Этапы проведения процедуры:

- 1) Сбор анамнеза, осмотр пациента.
- 2) Восстановление нейротропина 0,9% раствором NaCl.
- 3) Разметка: перед разметкой просим активно поработать мимическими мышцами (нахмуриться, удивиться, сощурить глаза) с целью определения анатомических особенностей мышц. Карандашом отмечаем точки для инъекций.
- 4) Определение необходимого количества единиц препарата для конкретного пациента, набор препарата в инсулиновые шприцы.
- 5) Обработка зон инъекций хлоргексидином.
- 6) Осуществление инъекций.
- 7) Заполнение медицинской документации.